AUTO-TEST

QCM 1

Un patient a des complications toxiques aigues liées à la consommation d'une substance addictive

- A Il est donc dépendant et vous le traitez comme tel.
- B Il est exclu qu'il soit dépendant, vous lui donnez quelques conseils simples
- C Vous explorez plus avant pour déterminer s'il est ou pas dépendant
- D Vous l'adressez à une assistance sociale
- E Vous l'adressez à une consultation de psychiatrie

QCM₂

Un patient vient à votre consultation pour une aide au sevrage d'une substance addictive. Au cours de l'entretien, vous apprenez qu'il a arrêté de consommer depuis 2 semaines.

- A Il est donc dépendant et vous le traitez comme tel.
- B Il est exclu qu'il soit dépendant, vous lui donnez quelques conseils simples
- C Vous explorez plus avant pour déterminer s'il est ou pas dépendant
- D Vous l'adressez à une assistante sociale
- E Vous l'adressez à un service d'urgence médicale

QCM 3

En quoi l'alcool se distingue-t-il des autres substances addictives ?

- A C'est une substance plutôt peu addictive, mais toxique de façon aigue et chronique
- B C'est une substance très addictive, mais plutôt peu toxique
- C C'est une substance parmi les plus addictives, sans provoquer de troubles comportementaux
- D C'est une substance parmi les plus addictives et qui provoque des troubles comportementaux
- E C'est une substance contrôlée par l'Etat.

En quoi le tabac se distingue-t-il des autres substances addictives ?

- A C'est une substance plutôt peu addictive, mais très toxique
- B C'est une substance très addictive, mais plutôt peu toxique
- C C'est une substance parmi les plus addictives, sans provoquer de troubles comportementaux
- D C'est une substance parmi les plus addictive et qui provoque des troubles comportementaux
- E C'est une substance contrôlée par l'Etat.

OCM 5

La constatation d'une rechute, chez une personne dépendante d'une substance vous permet de déterminer que

- A La personne n'a pas tenu compte de vos conseils et n'est pas prête pour arrêter.
- B Cela confirme que la personne est effectivement dépendante
- C La personne n'est pas motivée et une intervention brève pour augmenter sa motivation est nécessaire
- D Qu'il faut adresser la personne à un psychiatre
- E Qu'il faut adresser la personne à un pneumologue

Ce qui distingue l'usage avec addiction de l'usage « normal » sans addiction c'est

- A L'usage avec addiction peut entraîner des complications aigues
- B L'usage avec addiction peut entraîner des complications chroniques et pas l'usage sans addiction
 C Dans l'usage avec addiction la personne n'est pas motivée
- D Dans l'usage avec addiction, le contexte et les expériences personnelles ont peu d'influence sur l'usage
- E Un usager non dépendant ne peut pas décéder des conséquences de son usage